

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАКЦИНА  
ИЛИ ПРИВИВКА, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ  
БЫ ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, НЕ СОЗДАНЫ.  
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ,  
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ  
ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ



ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ПОЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ (БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА)



НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ  
ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

ВСЕ  
ВОЗРАСТНЫЕ  
ГРУППЫ  
ПОДВЕРЖЕНЫ  
ЗАРАЖЕНИЮ

280  
СЛУЧАЕВ  
ЗАРАЖЕНИЯ  
ЕЖЕДНЕВНО

БОЛЕЕ  
**45%**  
СЛУЧАЕВ  
ЗАРАЖЕНИЯ  
ПРОИСХОДИТ  
ПОЛОВЫМ  
ПУТЕМ



# СЕГОДНЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ —

ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТАК КАК ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И НЕ ДАЕТ ВИРУСУ РАЗВИВАТЬСЯ



**ВАЖНО ОТМЕТИТЬ!** БРАК И ПОСТОЯННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБА ПАРТНЕРА ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И ХРАНЯТ ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ.

КОМУ  
НЕОБХОДИМО  
СДАТЬ АНАЛИЗЫ?



ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ,  
КОТОРЫЙ ХОДИ БЫ  
РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ  
В ПОЛОВОЙ КОНТАКТ  
БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА  
ИЛИ ИМЕЛ ОПЫТ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ  
ИНЪЕКЦИОННЫХ  
НАРКОТИКОВ.

ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО  
ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕВОЗМОЖНО.  
ТЕСТ НА ВИЧ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОСТОВЕРНЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ВИРУС В  
КРОВИ ИЛИ НЕТ.



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

**СПИДЦЕНТР.РФ**

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:

**8 800 3 0000 34**



Областной Центр СПИДа  
г. Челябинск, ул. Пекинская, 7  
тел. регистратура: 8 (351) 214-99-08

**ЗАЧЕМ СДАВАТЬ  
ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?**

НЕЗНАНИЕ ВИЧ-СТАТУСА  
ПАРТНЕРА УВЕЛИЧИВАЕТ  
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
СДАТЬ ТЕМ ПАРАМ, КОТОРЫЕ  
РЕШИЛИ НАЧАТЬ ИНТИМНУЮ  
ЖИЗНЬ, ИЛИ — РЕШИЛИ  
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕЗЕРВАТИВА.



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
СДАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  
БЕРЕМЕННОСТИ, ТОЛЬКО ЭТО  
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕГО  
РЕБЕНКА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ.



ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕН  
В ИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО  
НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННО.  
ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В  
РОССИИ БЕСПЛАТНО.

# ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИПП В РФ



ЕЖЕГОДНО

265 000

СИФИЛИС, ГОНОРЭЯ, ХЛАМИДИОЗ,  
ТРИХОМОНИАЗ, ГЕРПЕС  
И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОРОДАВКИ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СРЕДНЕМ 4 000 ЧЕЛОВЕК

ИПП являются основной предотвратимой причиной бесплодия, особенно у женщин.



ПРИ ОТСУСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ИПП МОГУТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА.

Основным путем передачи венерических заболеваний является половой, но при некоторых инфекциях возможны и другие пути передачи: контактно-бытовой, внутриутробный, через кровь.

Первыми признаками инфекции могут быть выделения из мочеполовых путей, язвочки, покраснения, пузырьки, микротрецины на коже и слизистой оболочке половых органов, зуд или жжение во время мочеиспускания или полового контакта.



ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, НЕ ПРОИХОДИТ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ организма, если через некоторое время симптомы исчезают – этого является признаком перехода заболевания в скрытую форму.



КОМУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?

любому человеку, который хотя бы раз в жизни вступал в незащищенный контакт без презерватива

Челябинский областной клинический  
кожно-венерологический диспансер  
г. Челябинск, ул. Яблочкина, 24  
тел. регистратуры: 232-83-83; 232-00-28



ИНИФИЦИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ РАКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, В ЧАСТОТЫ, РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН.



НАДЕЖНЫМИ МЕРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ИПП ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИПП.