

# Министерство здравоохранения Челябинской области ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВАКЦИНА  
ИЛИ ПРИВИВКА, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ  
БЫ ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, НЕ СОЗДАНЫ.  
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ,  
ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ  
ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ



ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ПОЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ (БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА)



НИКОГДА НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ  
ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ



## СЕГОДНЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ —

ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТАК КАК ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И НЕ ДАЕТ ВИРУСУ РАЗВИВАТЬСЯ



**ВАЖНО ОТМЕТИТЬ!** БРАК И ПОСТОЯННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ТОЛЬКО ЕСЛИ ОБА ПАРТНЕРА ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ И ХРАНЯТ ВЕРНОСТЬ ДРУГ ДРУГУ.

КОМУ  
НЕОБХОДИМО  
СДАТЬ АНАЛИЗЫ?



ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ,  
КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ  
РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ  
В ПОЛОВОЙ КОНТАКТ  
БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА  
ИЛИ ИМЕЛ ОПЫТ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ  
ИНЪЕКЦИОННЫХ  
НАРКОТИКОВ.

ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО  
ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕВОЗМОЖНО.  
ТЕСТ НА ВИЧ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОСТО-  
ВЕРНЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ВИРУС В  
КРОВИ ИЛИ НЕТ.



БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

СПИДЦЕНТР.РФ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:  
8 800 3 0000 34



Областной Центр СПИДа  
г. Челябинск, ул. Пекинская, 7  
тел. регистратура: 8 (351) 214-99-08

**ЗАЧЕМ СДАВАТЬ  
ТЕСТ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ?**

НЕЗНАНИЕ ВИЧ-СТАТУСА  
ПАРТНЕРА УВЕЛИЧИВАЕТ  
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
СДАТЬ ТЕМ ПАРАМ, КОТОРЫЕ  
РЕШИЛИ НАЧАТЬ ИНТИМНУЮ  
ЖИЗНЬ, ИЛИ – РЕШИЛИ  
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕЗЕРВАТИВА.



ТЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО  
СДАТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  
БЕРЕМЕННОСТИ. ТОЛЬКО ЭТО  
Позволяет ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕГО  
РЕБЕНКА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ.



Е СЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕН  
В ИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ОЧЕНЬ ВАЖНО  
НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННО.  
ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В  
РОССИИ БЕСПЛАТНО.

# ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВОМ ПУТЕМ



ЕЖЕГОДНО

НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИЗЛЕЧИМЫХ ИППП В РФ

265 000

СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ,  
ТРИХОМОНИАЗ, ГЕРПЕС  
И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОРОДАВКИ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СРЕДНЕМ 4 000 ЧЕЛОВЕК

ИППП ЯВЛЯЮТСЯ  
ОСНОВНОЙ ПРЕДОТВРАТИМОЙ  
ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ,  
ОСОБЕННО У ЖЕНЩИН.



ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ  
ИППП МОГУТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ  
РЕПРОДУКТИВНОГО  
ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
МАТЕРИ И РЕБЕНКА.

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВОЙ, НО ПРИ НЕКОТОРЫХ ИНФЕКЦИЯХ ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ: **КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ, ВНУТРИУТРОБНЫЙ, ЧЕРЕЗ КРОВЬ.**

ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИИ МОГУТ БЫТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ МОЧЕПОЛОВОЙ ПУТЕЙ, ЯЗВОЧКИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ПУЗЫРЬКИ, МИКРОТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ, ЗУД ИЛИ ЖЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ИЛИ ПОЛОВОГО КОНТАКТА.



**ВАЖНО ОТМЕТИТЬ!** ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВОМ ПУТЕМ, **НЕ ПРОИСХОДИТ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ** ОРГАНИЗМА, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СИМПТОМЫ ИСЧЕЗАЮТ – ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ В СКРЫТУЮ ФОРМУ.



**КОМУ НЕОБХОДИМО СДАТЬ АНАЛИЗЫ?**

ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСТУПАЛ В НЕЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТАКТ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА

Челябинский областной клинический  
кожно-венерологический диспансер  
г. Челябинск, ул. Яблочкина, 24  
тел. регистратуры: 232-83-83; 232-00-28



ИНФИЦИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ РАКА ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ, В ЧАСТНОСТИ, РАКА ШЕЙКИ МАТЕРИ У ЖЕНЩИН.



НАДЕЖНЫМИ МЕРАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗДЕРЖАНИЕ ОТ ПОЛОВОЙ КОНТАКТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВА ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ И РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ИППП.